

Aknefug® Liquid 1 %

1 g Salicylsäure pro 100 ml Lösung

Zur Anwendung bei Kindern über 4 Jahre und Erwachsenen.

Liebe Patientin, lieber Patient, lesen Sie bitte die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Gebrauchsinformation beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Gebrauchsinformation steht

1. Was ist Aknefug Liquid 1 % und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Aknefug Liquid 1 % beachten?
3. Wie ist Aknefug Liquid 1 % anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Aknefug Liquid 1 % aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Aknefug Liquid 1 % und wofür wird es angewendet?

Aknefug Liquid 1 % ist eine schälende und antibakterielle Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Aknefug Liquid 1 % wird angewendet zur Linderung leichter, beginnender Akne.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Aknefug Liquid 1 % beachten?

Aknefug Liquid 1 % darf nicht angewendet werden

- bei Überempfindlichkeit gegen Salicylsäure, Salicylate und Propylenglycol oder einen der sonstigen Bestandteile von Aknefug Liquid 1 % (siehe Abschnitt 6 „Inhalt der Packung und weitere Informationen“),
- bei Säuglingen sowie bei Kindern, die das 4. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
- bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion. Hier darf Aknefug Liquid 1 % nur in Ausnahmefällen kleinflächig auf einer Körperfläche von maximal 10 cm² höchstens 3 Tage angewendet werden.
- auf Schleimhäuten, im Mund, im oder am Auge sowie im Genitalbereich sowie innerlich, da es u. a. 2-Propanol enthält.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Aknefug Liquid 1 % anwenden.

Kinder

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Aknefug Liquid 1 % ist erforderlich, da bei Kindern über 4 Jahren eine Tagesdosis von 0,2 g Salicylsäure (= 20 ml Aknefug Liquid 1 %) nicht überschritten werden darf.

Anwendung von Aknefug Liquid 1 % zusammen mit anderen Arzneimitteln

Salicylsäure kann die Aufnahme anderer, an derselben Stelle auf die Haut aufgetragener Arzneimittel verstärken.

Vom Körper aufgenommene Salicylsäure verzögert den Abbau von Methotrexat und verstärkt die Wirkung von Sulfonylharnstoffen.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Aknefug Liquid 1 % darf in der Schwangerschaft nur kleinflächig (Fläche kleiner als 5 cm²) angewendet werden.

Aknefug Liquid 1 % darf nicht an der stillenden Brust angewendet werden. Die zufällige Aufnahme von Salicylsäure durch den Säugling durch Kontakt mit der behandelten Körperstelle muss vermieden werden. Sollte der Arzt eine regelmäßige Behandlung großer Hautflächen mit Aknefug Liquid 1 % für notwendig halten, ist frühzeitig abzustellen, da Risiken wegen mangelnder Entgiftung bei Neugeborenen nicht auszuschließen sind.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Aknefug Liquid 1 % enthält Propylenglycol

Dieses Arzneimittel enthält 50 mg Propylenglycol pro 1 ml Lösung (entspricht ca. 50–300 mg Propylenglycol pro Anwendung).

Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.

3. Wie ist Aknefug Liquid 1 % anzuwenden?

Wenden Sie Aknefug Liquid 1 % immer genau wie in dieser Gebrauchsinformation beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Aknefug Liquid 1 % ist eine Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, wird Aknefug Liquid 1 % 1- bis 2-mal täglich dünn auf die erkrankten Hautpartien aufgetragen.

Bei jeder Anwendung verfahren Sie bitte wie folgt:

- Reinigen Sie zunächst Ihre Haut und trocknen Sie sie dann ab.
- Tränken Sie einen Wattebausch mit Aknefug Liquid 1 %.

- Tupfen oder reiben Sie Ihre Haut mit dem Wattebausch so ab, dass auf den erkrankten Hautstellen ein dünner Flüssigkeitsfilm von Aknefug Liquid 1 % entsteht.

Dauer der Anwendung

Aknefug Liquid 1 % ist nach ärztlicher Anweisung bzw. bis zur Abheilung der Erkrankung anzuwenden.

Wenn Sie eine größere Menge von Aknefug Liquid 1 % angewendet haben als Sie sollten

Setzen Sie die Behandlung beim nächsten Mal mit der normalen Menge fort.

Vergiftungen nach äußerlicher Anwendung von Aknefug Liquid 1 % sind bisher nicht bekannt geworden.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung von Aknefug Liquid 1 % sind Salicylsäure-Blutspiegel über 5 mg/dl und Vergiftungen (Intoxikationen) nicht zu erwarten.

Mit Vergiftungssymptomen ist erst ab Blutspiegeln von mehr als 30 mg/dl zu rechnen. Dann können Ohrensausen, Ohrgeräusche, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Reizbarkeit sowie Trockenheitsgefühl der Schleimhäute auftreten. Als Gegenmaßnahme genügt das Absetzen des Präparates.

Bei versehentlichem oder beabsichtigtem Trinken größerer Mengen von Aknefug Liquid 1 % können insbesondere bei Kindern Maßnahmen zur Entgiftung erforderlich werden. Benachrichtigen Sie Ihren Arzt. Gegebenenfalls sollte eine Vergiftungszentrale angerufen werden.

Wenn Sie die Anwendung von Aknefug Liquid 1 % vergessen haben

Nach einer vergessenen Einzeldosis wenden Sie bitte nicht die doppelte Menge von Aknefug Liquid 1 % an, sondern nehmen die Behandlung mit der vorgesehenen Dosis wieder auf.

Wenn Sie die Anwendung von Aknefug Liquid 1 % abbrechen

Wenn Sie die Anwendung von Aknefug Liquid 1 % abbrechen, sprechen Sie Ihren Arzt oder Apotheker an.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch Aknefug Liquid 1 % Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bedeutame Nebenwirkungen oder Zeichen, auf die Sie achten sollten, und Maßnahmen, wenn Sie betroffen sind:

Wenn Sie von einer der nachfolgend genannten Nebenwirkungen betroffen sind, wenden Sie Aknefug Liquid 1 % nicht weiter an und suchen Sie Ihren Arzt möglichst umgehend auf.

Sehr selten (weniger als 1 Behandler von 10000) können allergische Hautreaktionen auftreten.

Andere mögliche Nebenwirkungen

Selten (1 bis 10 Behandelte von 10 000) können Hautreizungen in Form von Brennen, Rötungen, Juckreiz, Austrocknung der Haut auftreten.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinfor-

mation angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Abt. Pharmakovigilanz Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 53175 Bonn

Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Aknefug Liquid 1 % aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Flaschenetikett angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Glasflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Halbbarkeit nach Anbruch: Bis zum auf dem Umkarton und der Flasche angegebenen Verfallsdatum.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden sie unter www.bfarm.de/arszweimittelenstorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Aknefug Liquid 1 % enthält:

- Der Wirkstoff ist Salicylsäure. 100 ml Lösung enthalten als Wirkstoff 1 g Salicylsäure (Ph. Eur.).
- Die sonstigen Bestandteile sind: 2-Propanol (Ph. Eur.), Propylenglycol, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser.

Wie Aknefug Liquid 1 % aussieht und Inhalt der Packung:

Aknefug Liquid 1 % ist eine klare, farblose Lösung in Glasflaschen.

Die Packungen enthalten 100 ml Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld

Telefon: (0521) 8808-05

Fax: (0521) 8808-334

E-Mail: aw-info@drwolffgroup.com

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2020.

DR·WOLFF