

# Aknefug® Oxid Mild 10%

13,33 g wasserhaltiges Benzoylperoxid (entspricht 10 g Benzoylperoxid) pro 100 g Gel

## Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

## Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Aknefug Oxid Mild 10% und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Aknefug Oxid Mild 10% beachten?
3. Wie ist Aknefug Oxid Mild 10% anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Aknefug Oxid Mild 10% aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### 1. Was ist Aknefug Oxid Mild 10% und wofür wird es angewendet?

Aknefug Oxid Mild 10% ist ein schälendes und antibakterielles Gel zur Anwendung auf der Haut. Aknefug Oxid Mild 10% wird angewendet bei allen Formen der endogenen (d. h. durch die hormonelle Umstellung in der Pubertät) bedingten Akne. Aknefug Oxid Mild 10% wird vor allem an Brust und Rücken angewendet sowie bei Patienten, die auf Aknefug Oxid Mild 5% nicht ausreichend ansprechen.

### 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Aknefug Oxid Mild 10% beachten?

#### Aknefug Oxid Mild 10% darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Benzoylperoxid oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- auf Schleimhäuten,
- im Mund-, Nasen- und Augenbereich,
- auf Hautabschürfungen.

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Aknefug Oxid Mild 10% anwenden.

Aknefug Oxid Mild 10% darf nicht in die Augen gelangen. Dies führt zu Rötung und Brennen. Bei versehentlichem Kontakt der Augen mit Aknefug Oxid Mild 10% sollten Sie diese gründlich mit Wasser spülen.

Durch Aknefug Oxid Mild 10% kann es zu einer stärkeren Reaktion auf UV-Licht kommen, was z. B.

zu einer erhöhten Sonnenbrandneigung führen kann. Daher sollten Sie eine intensive Sonnen- oder Solariumbestrahlung (UV-Bestrahlung) der mit Aknefug Oxid Mild 10% behandelten Körperregionen vermeiden.

Achten Sie darauf, dass Aknefug Oxid Mild 10% nicht in die Haare bzw. über die Hände oder die behandelte Haut auf farbige Textilien (z. B. Bettwäsche, Kleidung, Handtücher, Waschlappen) gelangt, da es sonst zu einer Bleichung (Entfärbung) dieser Textilien kommen kann.

Wenn Sie eine trockene oder sebstatische Haut (Haut mit verminderter Talgproduktion) haben oder zu Allergien neigen, sollten Sie Aknefug Oxid Mild 10% nur nach ärztlicher Anweisung anwenden.

### Anwendung von Aknefug Oxid Mild 10% zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden. Sie sollten während der Anwendung von Aknefug Oxid Mild 10% keine anderen hautreizenden Mittel anwenden.

### Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Aknefug Oxid Mild 10% sollte während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angewendet werden.

Aknefug Oxid Mild 10% sollte im letzten Monat der Schwangerschaft nicht angewendet werden.

### Aknefug Oxid Mild 10% enthält Ethanol (Alkohol) und Stearylalkohol

Dieses Arzneimittel enthält 375 mg Alkohol (Ethanol) pro 100 g Gel. Bei geschädigter Haut kann Ethanol ein brennendes Gefühl hervorrufen.

Stearylalkohol kann örtlich begrenzte Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

### 3. Wie ist Aknefug Oxid Mild 10% anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Aknefug Oxid Mild 10% ist ein Gel zur Anwendung auf der Haut.

Tragen Sie Aknefug Oxid Mild 10% 1- bis 2-mal täglich dünn auf die erkrankte Haut auf.

Wenn Sie sehr empfindliche Haut haben, sollten Sie Aknefug Oxid Mild 10% zu Beginn der Behandlung nur 1-mal täglich – am besten am Abend – anwenden oder zunächst ein schwächer dosiertes Arzneimittel mit 5% Benzoylperoxid anwenden.

Wenden Sie Aknefug Oxid Mild 10% bis zum Abklingen der entzündlichen Hauterscheinungen an. Dies dauert in der Regel etwa 4 Wochen.

#### **Anwendung bei Kindern und Jugendlichen**

Für Kinder und Jugendliche gelten die gleichen Dosierungsempfehlungen wie für Erwachsene.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Aknefug Oxid Mild 10% angewendet haben, als Sie sollten**

Wenn Aknefug Oxid Mild 10% zu dick oder zu häufig aufgetragen wird, können die unter Abschnitt 4. beschriebenen Hautreizungen verstärkt auftreten. In diesem Fall ist es ausreichend, die Anwendungshäufigkeit oder die angewendete Menge zu verringern bzw. den Überschuss mit einem Papiertuch abzuwischen oder mit Wasser abzuwaschen.

Wenn Sie oder jemand anders versehentlich etwas Aknefug Oxid Mild 10% verschluckt haben, kann der Wirkstoff Benzoylperoxid Beschwerden im Bereich der Speiseröhre und des Magens hervorrufen. Suchen Sie in diesem Fall umgehend einen Arzt auf.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Aknefug Oxid Mild 10% vergessen haben**

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben. Setzen Sie die Behandlung bei der nächsten Anwendung mit der üblichen Menge fort.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Aknefug Oxid Mild 10% abbrechen**

Wenn Sie die Anwendung von Aknefug Oxid Mild 10% abbrechen oder länger unterbrechen wollen, besprechen Sie die weitere Vorgehensweise mit Ihrem Arzt oder Apotheker, da in beiden Fällen der Behandlungserfolg sonst möglicherweise gefährdet ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

##### **Gelegentlich** (1 bis 10 Behandelte von 1 000)

Hautreizungen, wie z. B. Rötung, Juckreiz, Brennen, Spannen, insbesondere zu Beginn der Behandlung. Die leichten Hautreizungen, wie Rötung, Juckreiz, Brennen und Spannen der Haut, begünstigen den Heilungsverlauf und klingen in der Regel nach einigen Tagen ab. Ein Austrocknen und mäßiges Schälern der Haut sind ebenfalls erwünscht. Sollten diese Beschwerden nach 4–6 Tagen noch bestehen oder sich verstärken, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

##### **Selten** (1 bis 10 Behandelte von 10 000)

Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut mit Rötungen und Bläschenbildung, pseudoallergische Reaktion mit Schwellungen (Ödemen). Diese können auch verzögert auftreten. In diesen Fällen sollten Sie die Behandlung abbrechen und umgehend Ihren Arzt aufsuchen.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungs-

beilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für

Arzneimittel und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3  
53175 Bonn

Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. Wie ist Aknefug Oxid Mild 10% aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Tube nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Im Kühlschrank lagern (2°C–8°C).

Nach Anbruch 1 Jahr haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung](http://www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung).

#### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

##### **Was Aknefug Oxid Mild 10% enthält**

- Der Wirkstoff ist: Benzoylperoxid. 100 g Gel enthalten 13,33 g wasserhaltiges Benzoylperoxid (entspricht 10 g Benzoylperoxid).
- Die sonstigen Bestandteile sind: Carmellose-Natrium (E466), mikrokristalline Cellulose (E460a), Salzsäure (E507), Ethanol 96%, Macrogol 400, Macrogollaurylether (4) (Ph. Eur.), Macrogolstearylether (7) (Ph. Eur.), Stearylalkohol (Ph. Eur.), gereinigtes Wasser.

##### **Wie Aknefug Oxid Mild 10% aussieht und Inhalt der Packung:**

Aknefug Oxid Mild 10% ist ein gleichmäßig weißes, dünnflüssiges Gel in Kunststoffuben mit einer Verschlusskappe aus Polypropylen.

Aknefug Oxid Mild 10% ist in Packungen mit 40 g und 50 g Gel erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

##### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel  
Sudbrackstraße 56  
33611 Bielefeld

Tel.: 0521 8808-05

Fax: 0521 8808-334

E-Mail: [aw-info@drwolffgroup.com](mailto:aw-info@drwolffgroup.com)

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2021.**

DR·WOLFF